

# 西洋の=ブ(チェストベリ=)が効く日本で唯=のPMS治療薬

# PMS(月経前症候群)とは?

月経前、3~10日の間続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに、軽快ないし消失するも

のをいいます。

多のわロ女しP くあっゲ性てM いのるてスホいS ま女人いテルまの 性はる のエがす 黄原 0 期は 万人以 排は 4 卵っ 上症がと 後き 状

 月経周期と女性ホルモン分泌・基礎体温の関係

 女性 ホルモン か泌量 プロゲステロン=黄体ホルモン が泌量 月経周期 1日目 月経 卵胞期 黄体期 月経

 基礎体温
 6温期

原因の一つとして交感神経や副交感神経系の機能低下やバランスの乱れ、いわゆる自律神経の不調もという説もあります。

月経前に交感神経が活発になり、副交感神経が弱まるといったことも確認されています。

# あなたもこんな症状ありませんか?

### 精神神経症状

情緒不安定・イライラ・ 抑うつ・不安・眠気・集 中力の低下、睡眠障害

## 自律神経症状

のぼせ・食欲不振・過 食・めまい・倦怠感

# 身体的症状

腹痛・頭痛・腰痛・ むくみ・お腹の張り ・乳房の張り

# PMSの症状と付き合う

ために、自分のリズムを知って気分転換やリラックスする時間をつくったり、自分が心地良いと思えるようなセルフケアを探しては♡



ゼリア新薬

プレフェミン 3錠(30日分) 18歳以上 1日1回1錠

1,800円(本体) 1,980円(税込)

閉経後はエストロゲン(卵胞ホルモン)がほとんど分泌されなくなるため、陰部と陰は潤いを失い萎縮 し、不快感や痛み、痒みなどにより生活の質を低下させてしまいます。そんなあなたに!






第②類医薬品 太東製薬 バストミシ 4g(約26回分) **3.600円(本体)** 3.960円(税込)

エストラジオール(天然型の卵胞ホルモン) とエチニルエストラジオール(合成卵胞ホル モン)を配合し塗りやすいクリーム剤。 肝臓にやさしく、少量ずつ短期間だけエス トロゲンを補充でき、更年期障害や不感症 の改善が期待できます。 1日1回(入浴後~ 就寝前)、腕や脚、腰などに広くのばして刷 り込み、泌尿器・生殖器の場合は、外陰部 に直接塗布してください。

# バストミン適応セルフチェック



●更年期障害チェックシート

【更年期指数(小山式)】

		強	中	弱	なし
Q.1	顔がほてりますか?	10	6	3	0
Q.2	汗をかきやすいですか?	10	6	3	0
Q.3	腰や手足が冷えますか?	14	9	5	0
Q.4	息切れ、動悸がしますか?	12	8	4	0
Q.5	寝付きが悪い、または眠りが浅いでしょうか?	14	9	5	0
Q.6	怒りやすく、すぐいらいらしますか?	12	8	4	0
Q.7	くよくよしたり、抑うつになることがありますか?	7	5	3	0
Q.8	頭痛・めまい・吐き気がよくありますか?	7	5	3	0
Q.9	疲れやすいですか?	7	4	2	0
Q.10	肩こり・腰痛・手足の痛みがありますか?	7	5	3	0
Ī	該当する点の合計				点

●バストミン適応セルフチェック結果

タイプ	バストミン	詳細のご案内					
Α	$\bigcirc$	「バストミン」を外陰部に塗布して下さい。過剰投与による副作用を避けるため、2週間使用後に2週間休養し、症状改善後は休薬して下さい。					
В		なるべく薬剤に頼らず、食事や運動、休息など生活 習慣に注意しましょう。					
С	0	「バストミン」をお試し下さい。過剰投与による副作用を避けるため、2週間使用後に2週間休養し、症状改善後は休薬して下さい。					
D	0	「更年期障害チェックシート」の合計点が66点以上 ですと、中等度を超える更年期障害が心配されます ので、婦人科の受診をお勧めします。					
Ε	X	最近6ヶ月の間に未受診であれば、ご使用前の婦人科検診を強くお勧めします。子宮や乳房に異常や悪性腫瘍の既往症がある場合は、お勧め出来ません。					

# 使用する時期

### 生理のある方

生理後2週間塗布



次の生理が 終わるまで休薬

### 閉経後の方

すぐに使用可能2週間塗布



2週間以上休薬

悩んでいるあなた! 更年期障害・バストミン適応 セルフチェックシートでチェック してみてはいかがでしょうか。

